

Quoi de neuf pour l'évaluation de la douleur en cas d'atteinte cognitive?

M. Michel* et le collectif Doloplus**

* Service de gériatrie, CHU 35033 Rennes cedex 09

** Collectif Doloplus: F. Capriz, L. David, F. Gauquelin, C. Guillaume, S. Lefebvre-Chapiro, Y. Passadori, G. Pickering, P. Rat, B. Wary

Auto-évaluation (EVS, EN)



- sous-utilisée
- alors que fiable si MMS >18
- non proposée a priori

Hétéro-évaluation

Doloplus, ECPA, PACSLAC sous-utilisées
 Algoplus utilisée hors douleur aiguë

Solution: utiliser Algoplus comme mode d'entrée de l'hétéro-évaluation

Arbre décisionnel pour l'évaluation de la douleur chez la personne âgée:



Si doute sur douleur neuropathique

4DN4 : Questionnaire Douleurs Neuropathiques en 4 questions
 5Algoplus® : Echelle d'évaluation comportementale de la douleur aiguë chez la personne âgée présentant des troubles de la communication verbale (Rat et al., 2011)

6Doloplus : Échelle d'évaluation comportementale de la douleur chez les personnes âgées présentant des troubles de la communication verbale (Lefebvre-Chapiro., 2001)

7ECPA : Echelle Comportementale pour Personnes Âgées (Morello et al., 2007)

8PACSLAC : Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (Fuchs-Lacelle et al., 2004)