



Evaluation Instantanée du Bien-Etre (**EVIBE**) chez des patients présentant des troubles cognitifs avancés : *Relation avec les symptômes comportementaux et psychologiques des démences*

P. Delphin-Combe, A. Bathsavanis, C. Gueyraud, P. Denormandie, F. Bertin-Hugault, P. Krolak-Salmon

Centre de Mémoire, de Ressources et de Recherche de Lyon
Centre de Recherche Clinique « Vieillesse-Cerveau-Fragilité »


FM2J

Institut du bien vieillir Koran



2014 © Congrès National des Unités de soins d'évaluation et de prise en charge Alzheimer. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

EVIBE : une échelle visuelle analogique




Kuhnel et al., 2014 : Bonne reproductibilité inter-juge.

Bonne reproductibilité entre auto-évaluation et hétéro-évaluation.



Etude de la validité externe

Relation entre EVIBE et le NPI



N = 54

Âge : $86,2 \pm 6,5$

MMSE : $9,5 \pm 4,9$



2014 © Congrès National des Unités de soins d'évaluation et de prise en charge Alzheimer. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.



Résultats

- Moyenne EVIBE : $3,5 \pm 1,5$

Objectif principal:

- Corrélation entre EVIBE et NPI-ES aussi bien à T0 qu'à T1 ($p < 0,01$).

Objectif secondaire

- Corrélation entre EVIBE et agressivité, anxiété, apathie, exaltation de l'humeur, irritabilité à $p < 0,01$.
- Corrélation entre EVIBE et idées délirantes et sommeil à $p < 0,05$.





Conclusion

- La mesure de bien-être évaluée par l'EVIBE est en relation avec les troubles du comportement. Rend compte de la validité de structure externe de l'échelle.
- Outil simple d'utilisation, ne nécessitant pas de formation supplémentaire
- Intérêt +++ dans le cadre d'une démarche bien-traitante et dans le cadre d'une démarche de recherche.



En pratique quotidienne :

- Permettre aux patients de donner leur avis sur les différentes activités proposées
- Aider l'équipe soignante à adapter son comportement
- Respecter le choix des patients

En recherche :

Mesure directe du sentiment de bien-être à un instant précis

- Critère de jugement intéressant dans de nombreux protocoles médicamenteux et non médicamenteux.

